



**ИНСТРУКЦИЯ
по применению добавки кормовой
«Циамин»**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Добавка кормовая «Циамин» является источником цинка и предназначена для обогащения кормов, входящих в рацион молодняка КРС и КРС.
- 1.2. Кормовая добавка представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета.
- 1.3. В 100,0 г добавки кормовой содержится: не менее 400000 мг/кг цинка (в форме хелата цинка) и наполнитель.
- 1.4. Кормовая добавка не содержит генно - модифицированные продукты и организмы, безвредна, не токсична, совместима со всеми ингредиентами кормов и лекарственными средствами, а также с другими кормовыми добавками.
- 1.5. Добавку кормовую «Циамин» упаковывают в мешки бумажные или полимерные по 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 25,0 и 50,0 кг.
- 1.6. Добавку кормовую хранят в закрытых, вентилируемых, сухих помещениях.
- 1.7. Срок годности 2 (два) года со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

2. СВЕДЕНИЯ О КОРМОВОЙ ДОБАВКЕ

- 2.1. Основными компонентом добавки кормовой «Циамин» является хелат цинка. Цинк оказывает вяжущее действие, препятствует всасыванию токсинов и выходу жидкости в просвет кишечника.
- 2.2. Добавка кормовая «Циамин» необходима для нормального формирования костей и роста, для синтеза нуклеотидов, хромопротеидов, способствует интенсивному росту молодняка, интенсивному использованию кормов, влияет на формирование эритроцитов и отложение в костях кальция, участвует в окислительно-восстановительных реакциях, способствует усвоению фосфора и кальция.
- 2.3. При выращивании молодняка КРС добавка кормовая «Циамин» имеет первоочередное значение, так как цинк восполняет дефицит данного продукта у молодняка КРС, особенно в первых периодах выращивания (телята до бмесяцев), что резко сокращает смертность и болезненность.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ

- 3.1. Добавка кормовая «Циамин» предназначена для реализации, изготовления комбикормовой продукции и обогащения цинком кормов, входящих в рационы телят, особенно в первых периодах выращивания.
- 3.2. Добавку кормовую вводят в корма, комбикорма и кормосмеси в ручную, на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. Добавка при приготовлении корма выдерживает все используемые температурные режимы.
- 3.3. Дозы и способ применения добавки кормовой «Циамин».
Добавку кормовую «Циамин» применяют для нормализации обмена веществ, улучшения пищеварения и повышения резистентности организма молодняка КРС и КРС.
Добавку задают телятам с двух месячного возраста в течение 14 дней в дозе 20 гр. на 1 голову или 10кг на одну тонну корма с целью восполнения дефицита цинка и в случаях выявления желудочно- кишечных расстройств у телят.

Норма ввода кормовой добавки может отличаться от рекомендуемой в зависимости от качества кормов и условий содержания.

3.4. Добавка в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на организм телят. Побочного действия и противопоказаний не выявлено.

3.5. Продукцию животноводства при применении добавки кормовой можно использовать в пищевых целях без ограничений.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Все работы с добавкой необходимо проводить в спецодежде.

4.2. Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

4.3. После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1. В случае возникновения осложнений после применения добавки кормовой, её использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 19^а и изготовителю. Одновременно в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» высылают невскрытую упаковку добавки кормовой данной партии с подробным описанием осложнений.

6. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

6.1. ООО «ЗападВетСервис»

220035, Республика Беларусь, г. Минск, улица Тимирязева, дом 67, помещение 390.

Верно: 22.08.2017
г. Беларусь
Лавинский А.И.

