



ЭПРИСУЛЕС Пур-Он

Противопаразитарное средство широкого спектра действия для лечения и профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных, вызываемых экто- и эндопаразитами.

СОСТАВ:

В качестве действующего вещества в 100 мл препарата содержится 0,50 г эприномектина, а также вспомогательные вещества - до 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Эприномектин, входящий в состав «Эприсулес Пур-Он», относится к макроциклическим лактонам. Он обладает широким спектром противопаразитарного действия в отношении имагинальных и личиночных фаз развития нематод желудочно-кишечного тракта и легких (*Haemonchus* spp.; *Bunostomum* spp.; *Ostertagia* spp.; *Trichostrongylus* spp.; *Chabertia* spp.; *Cooperia* spp.; *Oesophagostomum* spp.; *Strongyloides papillosus*; *Nematodirus* spp.; *Toxocara vitulorum*; *Trichuris* spp., *Dictyocaulus viviparus*, *Dictyocaulus filaria*), а также в отношении эктопаразитов: саркоптоидных клещей (*Sarcoptes scabiei* var. *bovis*; *Psoroptes (comunis)* var. *Bovis* и др.), иксодовых клещей (*Rhipicephalus* spp.), насекомых и личинок оводов (*Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*), блох, вшей (*Haematopinus eurysternus*; *Linognathus vituli*; *Solenopotes capillatus* и др.), кровососущих мух (*Haematobia irritans*), паразитирующих у сельскохозяйственных животных. Механизм противопаразитарного действия эприномектина заключается в нарушении передачи нервных импульсов через мембраны нервных и мышечных клеток за счет селективного воздействия на глутаматчувствительные хлорные каналы и рецепторы ГАМК, что приводит в свою очередь к параличу и гибели паразита. Выводится из организма в основном с фекалиями и мочой.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

«Эприсулес Пур-Он» назначают в лечебных и профилактических целях крупному рогатому скоту, мелкому рогатому скоту и свиньям: при нематодозах (диктиокаулез, трихостронгилятозы, стронгилоидоз, аскаридадозы, буностомоз, телязхоз); при гиподерматозе, эстрозе, псороптозе, саркоптозе, сифункулятозе, маллофагозе; для борьбы с иксодовыми клещами, падальными и мясными мухами.

Лошадям: при стронгилятозах, гиподерматозе, параска-ридозе, оксирозе, саркоптозе и гастрофилезе.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

«Эприсулес Пур-Он» предназначен для местного применения, с помощью дозирующего устройства наносят на сухую неповрежденную кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца (на линию хребта).

Дозировка: 1 мл на 10 кг массы животного, что эквивалентно 0,5 мг эприномектина на 1 кг массы тела.

Против нематод применяют животным перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выводом на пастбище, против личинок оводов - сразу после окончания летнего сезона, против возбудителей арахно-энтомозов - по показаниям. Для выведения клещей препарат необходимо использовать каждый 21 день. Контроль внутренних и внешних паразитов осуществляется в течение 21-28 дней после лечения.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ:

Продукты убоя и молоко от обработанных животных реализуют без ограничения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Противопоказанием к применению «Эприсулес Пур-Он» является повышенная индивидуальная чувствительность животного к авермектинам. Не применять одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами, а также для обработки истощенных и больных инфекционными болезнями животных.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Срок годности: 2 года с даты производства. Хранить в заводской упаковке в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5°C до 30°C, отдельно от продуктов питания и кормов.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Полиэтиленовые бутылки объемом 1 л со встроенными измерительными камерами.



ООО «ТД «РостАгроВет», 143602, Россия, МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ул. Ямская, 17Б



Телефон: +7 (495) 363-45-30
Факс: +7 (495) 363-45-31



www.rostagrovet.ru
e-mail: office@rostagrovet.ru