

ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного лекарственного препарата «ТЕТРАЛАЙФ® Аэрозоль Спрей»

1 Общие сведения

1.1 ТЕТРАЛАЙФ® Аэрозоль Спрей (TETRALIFE® Aerosol Spray).

Международное непатентованное наименование активной фармацевтической субстанции: окситетрациклин.

1.2 По внешнему виду препарат представляет собой суспензию синего цвета.

Лекарственная форма: аэрозоль для наружного применения.

1.3 ТЕТРАЛАЙФ® Аэрозоль Спрей в 1 мл содержит в качестве действующего вещества окситетрациклина гидрохлорид – 37,50 мг (что соответствует 34,74 мг окситетрациклина), и вспомогательные вещества (твин 80, аэросил 200, сольвент голубой 45, алкотер, изопропиловый спирт).

1.4 Препарат выпускают в алюминиевых баллонах вместимостью 200 мл, содержащих 120 мл препарата, снабженных распылительными головками, специальными мерными клапанами и колпачками.

1.5 Препарат транспортируют и хранят с предосторожностью в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 15°C до 25°C.

Хранить в местах, недоступных для детей.

1.6 Срок годности препарата составляет 3 года с даты производства при соблюдении условий хранения и транспортирования в закрытой упаковке производителя. Не использовать по истечении срока годности.

1.7 Условия отпуска: отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

1.8 Лекарственный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2 Фармакологические свойства

2.1 ТЕТРАЛАЙФ® Аэрозоль Спрей относится к группе антибактериальных препаратов группы тетрациклинов.

Окситетрациклин, входящий в состав ТЕТРАЛАЙФ® Аэрозоль Спрей, обладает широким спектром действия и активен в отношении многих видов грамположительных (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.* и др.) и грамотрицательных микроорганизмов (*Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Fusobacterium necrophorum*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.*) и некоторых других.

2.2 Механизм бактериостатического действия окситетрациклина основан на подавлении белкового синтеза в микробной клетке на рибосомальном уровне.

2.3 При наружном применении лекарственный препарат не адсорбируется.

2.4 Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

3 Порядок применения

3.1 ТЕТРАЛАЙФ® Аэрозоль Спрей применяют с лечебной целью самостоятельно или в составе комплексной терапии крупному рогатому скоту, овцам, свиньям, собакам, кошкам при дерматитах, травматических повреждениях, ожогах, экземах, флегмонах, хирургических ранах, ссадинах, царапинах, некробактериозе крупного рогатого скота и овец.

3.2 Перед нанесением препарата рекомендуется очистить обрабатываемую поверхность от гноя, раневого экссудата, некротизированных тканей, удалить шерсть. Перед применением баллон с препаратом необходимо хорошо встряхнуть и распылять с расстояния 15-20 см от пораженного участка в течение 2-3 секунд. Повторять обработку каждые 12 часов до полного выздоровления (3 – 7 дней). По-

сле применения препарата животных в течение суток следует держать на сухой поверхности. В случаях глубоких и инфицированных ран, местное лечение рекомендуется сочетать с комплексной терапией.

3.3 Не допускать попадания препарата в глаза животному. В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды.

3.4 Противопоказания: повышенная чувствительность к антибиотикам тетрациклиновой группы и другим компонентам препарата.

3.5 Симптомы передозировки не установлены. Особенности действия при первом применении и отмене ТЕТРАЛАЙФ® Аэрозоль Спрей не выявлено.

3.6 В случае пропуска одной дозы курс лечения следует возобновить в предусмотренных инструкцией дозах и схеме применения.

3.7 При применении ТЕТРАЛАЙФ® Аэрозоль Спрей в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В редких случаях возможны аллергические реакции. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты и, при необходимости, симптоматические средства.

3.7 Применение ТЕТРАЛАЙФ® Аэрозоль Спрей не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной и симптоматической терапии.

3.8 Продукция животного происхождения во время и после применения препарата может быть использована в пищевых целях без ограничений. В случае вынужденного уоя животного обработанные препаратом участки туши зачищают и утилизируют.

4 Меры профилактики

4.1 Во время применения препарата следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности при работе с ветеринарными препаратами.

4.2 После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

4.3 При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ТЕТРАЛАЙФ® Аэрозоль Спрей. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

4.4 Огнеопасно. Баллон находится под давлением.

4.5 Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.

4.6 Не нагревать баллон выше 50°C.

4.6 Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

5 Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения проводится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

6 Полное наименование производителя

6.1 Провет Ветеринер Урюнлери Сан. ве Тидж. А. Ш., Чекирдесиз Орг. Сан. Бол. 210. Джад. №7 Полатлы/Анкара для УОРЛД ВЕТ Илач Сан. ве Тидж. Лтд. Шти, Турция.

Инструкция разработана сотрудниками «УОРЛД ВЕТ Илач Сан.ве Тидж. Лтд. Шти» и УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»

СОБЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)